


GRANDES CULTURES

BULLETIN N° 138 (10/88) du 21 JUIN 1988

MAIS : Pyrale, première intervention
TOURNESOL : Régression des pucerons
POIS : Fin des interventions
LUZERNE A GRAINE : Traitements cécidomyies


MAIS
PYRALE

SITUATION : Le vol a commencé en toutes zones.

PRECONISATIONS : Les populations larvaires de l'automne 1987 étaient supérieures à la normale. Les risques liés à la pyrale du maïs sont élevés en 1988 et le seront d'autant plus si Juillet s'averait pluvieux.

Où intervenir ? : se reporter à la carte ci-dessous

Légende traitement :




Indispensable

Conseillé

Envisageable
localement

Inutile



Quand intervenir ?

- Charente-Maritime - Sud Charente : A réception du bulletin selon le stade du maïs.

- Nord Charente - Plaine de Niort : Première décade de Juillet.

P.148



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
**SERVICE RÉGIONAL
 DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX**
 13, Rte de la Forêt - BIARD
 86000 POITIERS Tél. : 49.58.39.02

Publication périodique - Imprimerie de la Station Poitou-Charentes
 Directeur Gérant : ~~XXXXXXXXXXXX~~ J.P. PIQUEMAL
 CPPAP n° 1664 A.D. Abonnement annuel : 145 F.
 Chèque bancaire ou postal à l'ordre du
 sous régisseur de recettes Avertissements Agricoles

- Nord Deux-Dèvres - Vienne : Seconde décade de Juillet.

Stades d'intervention :

. 1 m à 1,20 m du maïs au plus tard pour les insecticides liquides.

. 10 pontes pour 100 pieds au stade panicules palpables dans le cornet pour les microgranulés.

Pour le choix des produits, reportez vous au dépliant SPV-AGPM.

TOURNESOL

PUCERONS

SITUATION : On observe une régression généralisée des populations due aux mycoses, à la présence de larves de syrphes et de microhyménoptères.

PRECONISATIONS : Peu de parcelles nécessitent un traitement. N'intervenir que si plus de 200 pucerons par plante au stade bouton étoilé.

RAPPEL : En cas de traitement, n'utiliser que des produits non dangereux pour les abeilles.

SCLEROTINIA

Des symptômes importants de sclérotinia sont visibles dans de nombreuses parcelles. L'efficacité des fongicides en préventif contre le sclérotinia est aléatoire et sans succès garanti ; en curatif sur symptômes déclarés, l'efficacité est nulle.

ATTENTION : L'emploi de fongicides peut détruire les mycoses présentes et favoriser la multiplication des pucerons.

POIS

SITUATION : **Botrytis** et **Anthraxnose** sont présents mais dans l'ensemble ont été relativement bien maîtrisés grâce aux traitements. La **Tordeuses du pois** reste très peu active.

PRECONISATIONS : Ne plus intervenir.

Erratum : Dans le dernier bulletin, une erreur s'est glissée à propos du traitement Botrytis, il fallait lire "30 jours après le début de la floraison, au lieu de "10 jours".

LUZERNE PORTE-GRAINE

SITUATION

PHYTONOMES : Activité limitée.

CECIDOMYIES DES FLEURS : - Les luzernes précoupées à la mi-mai, atteignent ou vont atteindre prochainement le stade sensible à la cécidomyie.

- Les luzernes précoupées tardivement ne sont pas encore à ce stade.

PRECONISATIONS

Pour les précoupes de la mi-mai, penser à votre premier traitement cécidomyies.

(C) SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation.